

Colonoscopia Para Niños



¿Qué es una colonoscopia?

Tu doctor ha recomendado una colonoscopia. Esta es una prueba especial que le permite a tu doctor mirar directamente la última parte del intestino para ayudarlo a saber por qué los niños tienen diarrea, sangrado y dolor de estómago. Después de

que el doctor te dé medicinas que te ayudarán a dormir, tomará un tubo flexible y delgado con una cámara y una luz para mirar dentro de tu recto. El doctor puede tomar muy pequeñas muestras de tejido, del tamaño de una cabeza de alfiler. Esto puede ayudar a que tu doctor se explique por qué podrías tener dolor de barriga (estómago), excremento acuoso (diarrea) o sangrado cuando vas al baño.

Razones por las que los niños pueden necesitar una colonoscopia

Hay muchas razones por las que los niños pueden necesitar un colonoscopia, incluyendo:

- Sangre en el excremento
- Diarrea
- Dolor de barriga
- Dolor de sentaderas (trasero)

¿Qué pasa antes y después de la prueba?

Antes de la prueba, se te hará tomar medicinas para sacar todo el excremento (también llamado heces fecales). También necesitarás beber muchos líquidos claros. Es importante que durante este tiempo no comas nada. El sacar todo el excremento, le permite a tu doctor ver que está pasando adentro. En la mañana de la prueba, no se supone que comas o bebas nada, ya que puede causar problemas con las medicinas usadas para ayudarte a dormir durante la prueba. Tu enfermera o doctor te dirán cuándo dejar de comer y empezar con las medicinas.

Después de la prueba, tu doctor puede tener fotos para mostrarte a ti y a tu familia. Al mismo tiempo, puede decirle a tu familia si hay alguna medicina para ti. Una vez que puedas beber líquidos sin problemas, puedes empezar a comer de nuevo e irte a casa. Algunos niños se sienten mal después de la prueba y pueden ser controlados un poco más, hasta que se sientan bien.

Después de la prueba, has que tus padres llamen a tu doctor si tienes...

- Dolor de barriga por más de una hora. La mayoría de los niños se siente bien después de la prueba.
- Vómitos por varias veces. Para asegurarse que éste no es un problema, intenta beber cantidades

pequeñas de bebidas como Sprite, gingerel, o come un poco de paleta de hielo.

- Sangrado. Puede ser normal que elimines pequeñas cantidades de sangre (menos de una cucharada) durante 1-2 días, pero si es más de que eso o continúa, avísales a tus padres y a tu doctor.
- Fiebre. Si hay fiebre persistente, avísale a tu doctor.

Para más información o para localizar a un gastroenterólogo pediátrico en su área por favor visite nuestro sitio web: www.naspghan.org

RECORDATORIO IMPORTANTE: Esta información es proporcionada por la Asociación Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas (NASPGHAN), como información general y no como base definitiva para diagnóstico o tratamiento en ningún caso en particular. Es sumamente importante que consulte a su médico sobre su condición específica.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS:



NASPGHAN • PO Box 6 • Flourtown, PA 19031
215-233-0808 • Fax: 215-233-3918